Prefeitura de SOROCABA

FLUXO DE ATENDIMENTO EM UNIDADE PRÉ HOSPITALAR PÚBLICO PARA SÍNDROME GRIPAL

SÍNDROME GRIPAL [1]

Não → Seguir fluxo de atendimento de rotina da unidade

Sim →

Casos Leves
(Pacientes com ou sem fatores de risco[2], **SEM** sinais de alarme[3] e **SEM** sinais de gravidade[4])

Casos Moderados
(Pacientes com ou sem fatores de risco[2], **COM** sinais de alarme[3] e **SEM** sinais de gravidade[4])

Casos Graves
(Pacientes com ou sem fatores de risco[2], **COM** sinais de alarme[3] e **COM** sinais de gravidade[4])

Contato íntimo domiciliar com caso confirmado laboratorialmente de COVID nos últimos 7 dias?

Não →

Teste Rápido Antígeno SARS-CoV-2 do D0 ao D7
(de acordo com disponibilidade do insumo)

Negativo →

Prescrição de oseltamivir para grupos indicados[6]
Notificar no e-SUS;
Afastamento apenas durante o período febril (em média 3 dias).

Positivo →

-Isolamento domiciliar;
-Sinais Vitais[5]
-Atestado médico (Fornecer atestado para os sintomáticos completando os 7 dias do início do sintomas. No 7° dia se o indivíduo não apresentar febre nas últimas 24 horas, sem uso de antitérmico, com melhora dos sintomas respiratórios, liberado do isolamento com uso de recomendações adicionais[8]
- Notificar no e-SUS conforme fluxo da VE;
-Orientar sinais de alarme [3] e de gravidade [4]
-Nos casos de pacientes adultos com quadro **MODERADO** preencher formulário no *google forms* saude.sorocaba.sp.gov.br/sindromegripal
-Em todos os casos pediátricos preencher a planilha on-line para monitoramento diário até o 10º dia
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnCFqb-gv4JID9SlKUKHans435YW174T1FfqAqJ-A9A/edit?usp=sharing

Sim →

-Encaminhar para leito de observação e manter em isolamento
-Monitoramento cardíaco e oximetria de pulso;
-Oxigenioterapia para manter Sat O² > 93%;
-Sinais Vitais;
-Notificar em ficha SRAG conforme fluxo da VE;
-Exames iniciais.
-Preencher formulário no *google forms* nos adultos saude.sorocaba.sp.gov.br/sindromegripal e planilha on-line para casos pediátricos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnCFqb-gv4JID9SlKUKHans435YW174T1FfqAqJ-A9A/edit?usp=sharing

Coletar Teste Rápido Antígeno SARS-CoV-2 (de acordo com disponibilidade do insumo - do D0 ao D7) e Colher RT-PCR para SARS-CoV-2 (do D0 ao D14)

-Azitromicina VO 500 mg/dia ou 15mg/kg/dia por 5 dias (somente na suspeita ou presença de infecção bacteriana associada)
-Ceftriaxone 1 grama ou 100 mg/kg/dia EV de 12/12 h por 5-7 dias (máx 2 gramas/dia) - somente na suspeita ou presença de infecção bacteriana associada
-Dexametasona 6 mg/dia EV (apenas para pacientes em uso de oxigênio)
-**Oseltamivir 75 mg VO de 12/12 h por 5 dias(Apenas se paciente tiver Teste rápido antígeno SARS-CoV-2 negativo, se enquadrar no grupo de indicações para prescrição de Oseltamivir [6]** e NÃO ter tido contato domiciliar com caso confirmado de COVID positivo laboratorialmente nos últimos 7 dias (se paciente < 1 ano posologia conforme quadro [7]) - Para maiores informações sobre o oseltamivir, inclusive para obtenção do formulário de dispensão acessar o link abaixo:https://saude.sorocaba.sp.gov.br/destaques/oseltamivir/

Solicitar vaga CROSS e inserir o resultado do RT-PCR/teste rápido antígeno

Acionar **SAMU** quando vaga CROSS cedida
** Em casos de óbito por SRAG, deverá ser coletado material RT-PCR antes do manejo do corpo

Pacientes que preenchem critérios para o uso de Antiviral Nirmatrelvir /Ritonavir seguir Fluxo Municipal:

Fluxograma para Notificação,testagem, isolamento, tratamento com indicação de Oseltamivir e critérios para prescrição Antiviral Nirmatrelvir /Ritonavir.

Revisado 15/07/2024

Prefeitura de SOROCABA

FLUXO DE ATENDIMENTO EM UNIDADE PRÉ HOSPITALAR PÚBLICO PARA SÍNDROME GRIPAL

1- Definição de Síndrome Gripal (SG):
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sintomas:
Febre ≥ 37,8ºC(ou mesmo relatada), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos, sintomas gastrointestinais ou mialgia. Em crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar ausente e devem ser considerados também critérios específicos, de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

3- Sinais de Alarme
-Febre por mais de 72 horas;
-Inapetência/ prostração com dificuldade para se alimentar

4-Sinais de gravidade (SRAG ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sintomas de síndrome gripal associada aos sinais de gravidade)
-FR ≥ 22 irpm ou acima do valor de referência para a idade [5] ou
-Sinais de desconforto respiratório ou
-Saturação < 95% em ar ambiente ou
-Cianose labial/facial ou
-Alteração do nível de consciência ou
-Exacerbação de doença pré existente
-Para crianças, os principais sintomas incluem taquidispnéia (maior ou igual a 53 irpm para menor de 1 ano e maior que 37 irpm para maiores que 1 ano),hipoxemia, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar/recusa alimentar, letargia, convulsões, batimentos das asas nasais, tiragem intercostal,desidratação e inapetência.

5- Frequência Respiratória de acordo com a idade

Idade	FR (irpm)
1-12 meses	até 53
1-2 anos	até 37
3-5 anos	até 28
6-11 anos	até 25
12-17 anos	até 20
>17 anos	até 22

2- Fatores de risco
Idade>=60 anos;
Gestantes;
Hipertensão;
Diabetes;
Obesidade - IMC >30;
Tabagismo;
Miocardiopatia;
Doença cerebrovascular;
Pneumopatias graves ou descompensadas;
Imunodepressão e imunossupressão
Doenças renais crônicas em estágio avançados (estagios 3,4 e 5)
Doenças crônicas com estado de fragilidade imunológica;
Neoplasia maligna;
Cirrose hepática;
Doenças hematológicas(incluindo anemia falciforme e talassemia)

6- Indicações de prescrição de Oseltamivir (Iniciar PREFERENCIALMENTE até 48 horas do início dos sintomas)
Grávidas e puérperas (até duas semanas do parto),
Adultos >= 60 anos
Crianças < 5 anos
Pneumopatia crônica (inclui asma)
Cardiovasculopatias (exclui HAS)
Nefropatias
Doença hematológica
Distúrbios metabólicos (inclui Diabetes Mellitus)
Síndromes genéticas/transtornos neurológicos
Imunossupressão
Obesidade (IMC >= 40)
Uso prolongado de AAS

7- Posologia do Oseltamivir

Droga	Faixa etária		Posologia
Oseltamivir	Adulto		75mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
	Criança maior de 1 ano de idade	≤15kg	30mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		>15kg a 23kg	45mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		>23kg a 40kg	60mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		>40kg	75mg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
	Criança menor de 1 ano de idade	0 a 8 meses	3mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias
		9 a 11meses	3,5mg/kg, via oral, 12 em 12 horas por 5 dias

8- Se o resultado do RT-PCR estiver disponível apenas APÓS transferência do paciente, encaminhar o resultado para o e-mail do Hospital para o qual o paciente foi transferido:
GPACI: ccih@gpaci.org.br
SANTA CASA SOROCABA: scih@santacasasorocaba.com.br
SANTA LUCINDA: scih@hospitalsantalucinda.com.br
CHS: chs.nve@gmail.com

Revisado 15/07/2024