

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA</b> <b>SECRETARIA DA SAÚDE</b> <b>Serviço de Enfermagem</b>	Procedimento Operacional Padrão Nº 32
<b>TÍTULO:</b> Prova do laço			
<b>Emitido por:</b> Vide colaboradores	<b>Analisado por:</b> Alexandre Duarte da Silva	<b>Aprovado por:</b> Fátima dos Santos	
<b>Emitido em:</b> Dezembro 2019	<b>Validado em:</b> Janeiro 2020	<b>Revisão em:</b> Dezembro 2021	
<b>Objetivo:</b> Identificar pequenas hemorragias ocorridas pela fragilidade da rede vascular			

### Definição

Método de verificação da fragilidade da rede vascular pela compressão do braço com esfigmomanômetro em determinado período de tempo, sendo auxiliar no diagnóstico de algumas doenças.

### Profissionais envolvidos

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

### Materiais necessários

Esfigmomanômetro; estetoscópio; relógio; caneta, régua.

### PROCEDIMENTO

- Reunir os materiais a serem utilizados;
- Dirigir-se ao cliente, não esquecendo de explicar-lhe o procedimento;
- Verificar a pressão arterial do cliente (deitado ou sentado);
- Calcular o valor médio: PA sistólica + PA diastólica dividido por 2;
- Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos (em crianças, 3 minutos e em adultos 5 minutos) ou até o aparecimento das petéquias;
- Na região de maior concentração das petéquias, geralmente no antebraço, desenhar um quadrado de 2,5 cm de lado;
- Contar o número de petéquias dentro do quadrado: a prova será positiva se houver mais de 20 petéquias em adultos e 10 em crianças;
- Não esquecer-se do registro do procedimento em prontuário.

**Observações:**

- Lançar o procedimento no Sistema de Informações em Saúde – SIS;
- A prova do laço é importante para a triagem do paciente suspeito de dengue, pois pode ser a única manifestação hemorrágica de casos complicados, podendo representar a presença de plaquetopenia ou de fragilidade capilar (deve ser realizada durante o acompanhamento para o estadiamento do caso);
- Se a prova do laço apresentar-se positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, a mesma pode ser interrompida.
- A prova do laço frequentemente pode ser negativa em pessoas obesa e durante o choque.

**Referências**

Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão. 5ª Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.