


FLUXOGRAMA PARA ISOLAMENTO E TESTAGEM DE SÍNDROME GRIPAL

Atualizado em 03/04/2023

¹**Definição de Síndrome Gripal:** Quadro respiratório agudo, com pelo menos dois (2) dos seguintes sintomas: febre $\geq 37,8$ C (ou mesmo relatada), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos. Em crianças considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar ausente e devem ser considerados também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de Covid-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais podem estar presentes.

²**Recomendações adicionais:** usar máscara bem ajustada ao rosto em casa ou em público; evitar aglomerações, evitar comer próximo a outras pessoas;



Encerrar caso no e-SUS (unidades encerram casos que coletam TR e vigilância casos que coletaram PCR)

³**Fatores de risco:** idade ≥ 60 anos; Gestantes; Presença de comorbidades (hipertensão, diabetes, doença pulmonar prévia, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, doença neurológica, imunossupressão, câncer, doença renal crônica em estágio avançado- graus 3,4 e 5, obesidade IMC >30 , portador de doença cromossômica); Uso de corticóide ou imunossupressor; doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia)

Orientar a todos os pacientes para retornar ao atendimento se **Sinais de Alarme**⁴
Febre por mais de 72 horas ; inapetência/prostração com dificuldade para se alimentar
OU Sinais de gravidade⁵: FR ≥ 22 irpm ou acima do valor de referência para a idade ou sinais de desconforto respiratório ou Sat O₂ $< 95\%$ em ar ambiente ou cianose labial ou alteração de nível de consciência ou exacerbação da doença de base;

⁶**Indicação de uso de oseltamivir:** grávidas e puérperas (até duas semanas do parto), ≥ 60 anos, < 5 anos, pneumopatia crônica (inclui asma), cardiopulmopatia (exclui HAS), nefropatia, doença hematológica, distúrbio metabólico (inclui Diabetes Mellitus), síndromes genéticas/neurológicas, imunossupressão, obesidades (IMC ≥ 40), uso prolongado de AAS.

ATENÇÃO: Não há indicação para isolamento de contactantes intra domiciliar ou escolares.

FLUXOGRAMA PARA ISOLAMENTO E TESTAGEM DE SÍNDROME GRIPAL

Atualizado em 03/04/2023

⁷ Pacientes elegíveis para uso de antiviral (nirmatrelvir/ritonavir):

Pacientes com quadros leves/moderados que estejam nos grupos abaixo descritos:

- Grupo 1: indivíduos ≥ 18 anos com imunossupressão de alto grau e indivíduos com idade ≥ 75 anos, independentemente de comorbidades;
- Grupo 2: indivíduos ≥ 65 anos, com pelo menos duas comorbidades;
- Grupo 3: indivíduos ≥ 65 anos, com apenas uma comorbidade;
- Grupo 4: indivíduos ≥ 65 anos, sem comorbidades;
- Grupo 5: indivíduos com imunossupressão⁸ de baixo grau, idade ≥ 18 anos

Para ter acesso ao tratamento, independentemente do status vacinal, o paciente que se enquadre em um dos grupos anteriormente citados deve cumprir todos os pré-requisitos a seguir:

- Ter covid-19 confirmada por teste rápido de antígeno ou por teste de biologia molecular.
- Estar entre o 1º e o 5º dia de sintomas.
- Apresentar quadro clínico leve ou moderado (covid-19 não grave) - Não requerer oxigênio suplementar.
- Em pacientes em uso prévio de oxigênio domiciliar por doenças pré-existentes, o tratamento poderá ser indicado, desde que não haja necessidade da oferta adicional de oxigênio além do O2 basal por complicações da covid-19.
- A infecção assintomática é caracterizada por teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2 e ausência de sintomas. O medicamento não está indicado para o tratamento de casos assintomáticos.

⁸ Definição de imunossupressão, para fins de uso dos antivirais em pessoas com idade ≥ 18 anos:

- Imunodeficiência primária grave ou erros inatos da imunidade;
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHIV) com CD4 < 200 céls/mm³ (últimos seis meses) ou ausência/abandono de tratamento;
- Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por um período ≥ 14 dias, ou em pulsoterapia com metilprednisolona;
- Insuficiência renal crônica não dialítica, com taxa de filtração glomerular (TFG) ≥ 30 mL/min;
- Doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, autoimunes e auto inflamatórias em tratamento com medicamentos modificadores da resposta imune
- Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

Referência:

1. Nota técnica nº 6/2023- CGVDI/DIMU/SVSA/MS