


FLUXOGRAMA TESTAGEM E MEDIDAS DE ISOLAMENTO DE CASOS DE SRAG

Atualizado em 03/04/2023

Definição de Síndrome Gripal: Quadro respiratório agudo, com pelo menos dois (2) dos seguintes sintomas: febre $\geq 37,8$ C (ou mesmo relatada), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos. Em crianças considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar ausente e devem ser considerados também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

Definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)*: Síndrome gripal que apresente: dispneia/ desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax ou saturação de O₂ menor que $\leq 94\%$ em ar ambiente ou coloração azulada em lábios ou rosto. Para crianças, os principais sintomas incluem taquidispneia (maior ou igual a 53 ipm para menor de 1 ano e maior que 37 ipm para maiores que 1 ano), hipoxemia, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar/recusa alimentar, letargia, convulsões.

Indicação de uso de oseltamivir:** grávidas e puérperas (até duas semanas do parto), ≥ 60 anos, < 5 anos, pneumopatia crônica (inclui asma), cardiovascular (exclui HAS), nefropatia, doença hematológica, distúrbio metabólico (inclui Diabetes Mellitus), síndromes genéticas/neurológicas, imunossupressão, obesidades (IMC ≥ 40), uso prolongado de AAS



ATENÇÃO:

Os serviços particulares devem garantir retaguarda laboratorial para realização dos testes diagnósticos para COVID-19.

As unidades de atendimento SUS poderão encaminhar amostras de Swab de naso e orofaringe ao Instituto Adolfo Lutz (IAL) através de fluxo de visitadoras da Vigilância Epidemiológica.

Até o momento os testes rápidos de Ag para Influenza não são validados para diagnóstico definitivo.

Não há indicação para isolamento de contactantes intra domiciliar ou escolar/laboral.

Nos casos de SRAG que evoluírem para óbito sem a coleta de swab, coletar amostra antes do manejo do corpo.

*** para realização desta investigação avaliar necessidade de recoleta quando grave, hospitalizado – discutir com a Vigilância envio de amostra ao IAL.

Referência:

1. Nota técnica nº 6/2023- CGVDI/DIMU/SVSA/MS