

# FICHA DE TRIAGEM PARA PACIENTES COM SUSPEITA SEPSE PEDIÁTRICA

**LOCAL DE INTERNAÇÃO:**

**DADOS DO PACIENTE:**

Nome completo: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_\_ RH: \_\_\_\_\_

Leito: \_\_\_\_\_

## ENFERMAGEM/MÉDICO 1 – PACIENTE APRESENTA PELO MENOS DOIS DOS SINAIS DE SIRS, SENDO UM DELES FEBRE E/OU ALTERAÇÃO DE LEUCÓCITOS?

Idade	FC (bpm)	Leucócitos* ( $\times 10^3/\text{mm}^3$ )	FR (ipm)	Temperatura* (°C)	PAS (mmHg)
1m - 1a	( ) >190 ou < 90	( ) >17,5 ou < 5,0	( ) >60	( ) > 38,5 ou < 36	( ) < 70
2 - 5a	( ) > 140	( ) >15,5 ou < 6,0	( ) >40	( ) > 38,5 ou < 36	( ) < 70 + (idade em anos x2)
6 - 12a	( ) >140	( ) >13,5 ou < 4,5	( ) >30	( ) > 38,5 ou < 36	( ) < 70 + (idade em anos x2)
13 - <18a	( ) >100	( ) >11,0 ou < 4,5	( ) >16	( ) > 38,5 ou < 36	( ) < 90

## OU PACIENTE APRESENTA UM DOS CRITÉRIOS DE DISFUNÇÃO ORGÂNICA ABAIXO?

- ( ) Alteração de perfusão  
 ( ) Mudança aguda do estado neurológico – ( ) irritabilidade ( ) agitação ( ) choro inapropriado ( ) sonolência  
 ( ) pobre interação com familiares ( ) letargia ( ) coma  
 ( ) Oligúria ( $\leq 0,5\text{mL/kg/h}$ )  
 ( ) Dessaturação ( $\text{SpO}_2 < 92\%$ ) em ar ambiente      ( ) Hipotensão  
 Acionamento equipe médica: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ :

## AVALIAÇÃO MÉDICA 1 – PACIENTE APRESENTA HISTÓRIA SUGESTIVA DE INFECÇÃO

BACTERIANA/FÚNGICA? ( ) Não

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ( ) Pneumonia/empiema        | ( ) Infecção de prótese                                 |
| ( ) Infecção urinária        | ( ) Infecção óssea/articular                            |
| ( ) Infecção abdominal aguda | ( ) Infecção de ferida operatória                       |
| ( ) Meningite                | ( ) Infecção de corrente sanguínea associada ao cateter |
| ( ) Endocardite              | ( ) Outras infecções: _____                             |
| ( ) Pele e partes moles      | ( ) Sem foco definido                                   |

## AVALIAÇÃO MÉDICA 2 – O PACIENTE APRESENTA CRITÉRIOS PARA:

- ( ) Sepse (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames para descartar disfunção orgânica laboratorial)  
 ( ) Sepse grave  
 ( ) Choque séptico  
 ( ) Afastado sepse/sepsis grave/choque séptico  
 ( ) Sepse grave/choque séptico em cuidados de fim de vida sem conduta no momento

## CONDUTA MÉDICA:

- ( ) Coleta dos exames laboratoriais E/OU  
 ( ) Prescrever antimicrobianos E/OU  
 ( ) Ressuscitação volêmica  
 ( ) Encerrar o atendimento

Data e hora da coleta: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Data e hora da primeira dose: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Data e hora: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

Data e hora do atendimento médico: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

## AVALIAÇÃO MÉDICA 3 – APÓS EXAMES E RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA, HÁ PERSISTÊNCIA DE:

- ( ) Hipotensão - com ou sem droga  
 ( ) Alteração de perfusão  
 ( ) Lactato  $\geq 2$  vezes o valor de referência  
 ( ) INR  $> 2$  e/ou plaquetas  $\leq 80.000\text{mm}^3$   
 ( ) creatinina  $\geq 2$  vezes o valor normal para idade ou  $\geq 2$  vezes valor basal  
 ( ) bilirrubinas  $\geq 4 \text{ mg/dL}$  e/ou ALT/TGP  $\geq 2$  vezes o valor normal para idade  
 ( ) diminuição da Glasgow  $\geq 3$  em relação ao basal ou Glasgow  $\leq 11$

Data e hora da primeira disfunção orgânica: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

O caso ficou confirmado como:

- ( ) Sepse      ( ) Sepse grave / Choque séptico      ( ) Afastado sepse

MÉDICO: \_\_\_\_\_ CRM: \_\_\_\_\_  
 ENFERMEIRO: \_\_\_\_\_ COREN: \_\_\_\_\_

Baseado na ficha de triagem do ILAS revisado em  
 janeiro de 2019