

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DA SAÚDE Serviço de Enfermagem	Procedimento Operacional Padrão Nº 60
TÍTULO: Administração de medicamentos por via auricular		
Emitido por: Vide colaboradores	Analisado por: Fernanda Figueira Aguiar	Aprovado por: Michelle C. R. Leonardo
Emitido em: Outubro 2019	Validado em: Outubro 2023	Revisão em: Outubro 2025
Objetivo: Administrar medicação prescrita em pacientes em tratamento de patologias otológicas, para diminuir o cerúmen, aliviar a dor e anestésiar.		

Definição

É a administração de medicamentos em gotas ou em pomadas na região Auricular.

Profissionais envolvidos

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem.

Materiais necessários

- Bandeja;
- Lenço de papel ou gaze;
- Medicação prescrita;
- Álcool a 70%;
- Luva de procedimento.

PROCEDIMENTO

- Verifique a exatidão e a totalidade de cada registro de administração de medicamento do médico. Confira o nome do paciente e o nome do medicamento, dosagem, via e horário de administração;
- Realizar a higienização das mãos;
- Fazer o rótulo de identificação do medicamento com: nome, dose, horário, via de administração e paciente;
- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%;
- Realizar a higienização das mãos;
- Conferir o rótulo com os dados do paciente e a prescrição médica;

- Reunir o material a ser utilizado na bandeja;
- Colocar a identificação no medicamento;
- Levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira;
- Informar o procedimento ao paciente;
- Posicionar o paciente sentado ou deitado, com a cabeça lateralizada;
- Realizar a higienização das mãos conforme POP nº01;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Segurar a porção superior do pavilhão auricular, puxar suavemente o lóbulo para cima e para trás;
- Observar presença de secreção, se houver, o canal auditivo deve ser cuidadosamente limpo com gaze;
- Pingar a quantidade prescrita do medicamento (não encostar no paciente);
- Pedir ao paciente para permanecer com a cabeça lateralizada por 3 minutos e supervisionar;
- Quando a bola de algodão é necessária, coloque-a na parte mais externa do canal. Não pressione o algodão profundamente no canal. Remova-a depois de 15 minutos;
- Administrar a medicação no ouvido paralelo se estiver prescrito, e repetir o mesmo procedimento;
- Recolher o material utilizado, deixando a unidade do paciente em ordem;
- Encaminhar a bandeja para a sala de utilidades onde deverá ser lavada com água e sabão, seca com papel toalha e desinfetada com álcool a 70% 3 vezes de forma unidirecional;
- Realizar a higienização das mãos novamente;
- Checar o horário da administração do medicamento na prescrição médica;
- Fazer anotação de enfermagem em prontuário eletrônico;
- Realizar evolução de enfermagem (enfermeiro).

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.

Campinas (Cidade). Secretaria da Saúde. Protocolo Operacional Padrão (POP) Enfermagem. Manual_Procedimentos_Operacionais_Padrao_POP_Enfermagem_2016.pdf.

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento / Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. – São Paulo: COREN-SP, 2017.