

ANEXO 5 – VALIDADE DAS VACINAS

VACINA	Laboratório	PRAZO PARA UTILIZAÇÃO APÓS ABERTURA DO FRASCO
dT	Biological	4 semanas
	Butantan	15 dias
	Intervax	4 semanas
	Serum	4 semanas
DTP	Butantan	15 dias
	Serum	4 semanas
DTPa adulto	Butantan	Uso imediato
	Glaxo Smith Kline	Uso imediato
Pentavalente	Biological	Uso imediato
	Serum	Uso imediato
Hepatite A	Butantan	Uso imediato
	Merck Sharp & Dome	Uso imediato
BCG	Fundação Atauilpho de Paiva	06 horas
	Serum	06 horas
Febre Amarela	Fundação Oswaldo Cruz	06 horas
	Sanofi Pasteur	06 horas
Hepatite B	Butantan	15 dias
	LG	28 dias
	Serum	28 dias
HPV	Butantan	Uso imediato
Meningo C	Fundação Ezequiel Dias	Uso imediato
Pneumo 10	Fundação Oswaldo Cruz	Uso imediato
VOP	Fundação Oswaldo Cruz	5 dias
	Serum	28 dias
VIP	Sanofi Pasteur	28 dias
	Fundação Oswaldo Cruz	28 dias
Rotavírus	Fundação Oswaldo Cruz	Uso imediato
SCR	Fundação Oswaldo Cruz	08 horas
	Serum	06 horas
Tetra viral	Fundação Oswaldo Cruz	Uso imediato
Varicela	Fundação Oswaldo Cruz	Uso imediato
	Glaxo Smith Kline	Uso imediato
	Green Cross	Uso imediato
	Merck Sharp & Done	Uso imediato